

WACHTTIJD VOLGENS FEI 0 UREN\*

KARENZTIJDE FEI 0 STUNDEN\* FN 0 STUNDEN

DELAÏ D'ARRÊT D'UTILISATION  
AVANT COMPÉTITION FEI 0 HEURE\*

**NL** Gebruik  
Geef GastriAid dagelijks voor een rustige en  
gezonde spijsvertering.

| Paarden                    | g<br>per dag | schepjes<br>per dag |
|----------------------------|--------------|---------------------|
| Hoge dosering (3-10 dagen) | 120          | 6                   |
| Onderhoudsdosering         | 60           | 3                   |

| Ponys                      | g<br>per dag | schepjes<br>per dag |
|----------------------------|--------------|---------------------|
| Hoge dosering (3-10 dagen) | 80           | 4                   |
| Onderhoudsdosering         | 40           | 2                   |

Bij kleskeurige eters geleidelijk introduceren.  
De onderhoudsdosering kan individueel worden  
aangepast en is niet noodzakelijkerwijs afhankelijk van  
het lichaamsgewicht.

Een afgestoken maatschepje van 25 ml bevat  
ongeveer 20 g. Een pot van 3,6 kg is bij een dagelijkse  
dosering van 60 g voldoende voor ca. 60 dagen.

#### Ingrediënten

**Samenstelling**  
Psylliumzuurzaadschillen (als poeder), Natrium  
bicarbonaat, Calcium Carbonaat, Luzern (gedroogd op  
hoge temperatuur), Koollaadolie (geraffineerd),  
Biergist, Product van gist\*, Fructo-oligosaccharide,  
Inuline uit cichorei (FOS), Natrium chloride,  
Calcium stearaat.

\*Gist, bronnen van MOS (Mannan-Oligosacchariden)  
en postbiotische gistmetabolieten.

#### Toevoegingen (per kg)

| Nutritioneel        |          |
|---------------------|----------|
| Aminosuren          |          |
| L-Glutamine (3c451) | 5.020 mg |

| Technologisch     |            |
|-------------------|------------|
| Bindmiddel        |            |
| Bentoniet (1m558) | 498.000 mg |

| Conservermiddel      |       |
|----------------------|-------|
| Fumazaarzuur (1a297) | 30 mg |

| Zoötechnisch                                      |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Voor de spijsvertering                            |                            |
| Saccharomyces cerevisiae<br>(4b1702, CNCM I-4407) | 1,4 x 10 <sup>11</sup> cfu |

| Analytische bestanddelen                                                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ruw eiwit 5,8 %, Ruw vet 2,7 %, Ruwe as 58,7 %, Ruw celstof 8,1 %, Natrium 3,4 %, In zuur oplosbare as 34,2 %, Fosfor 0,13 %, Calcium 3,98 %. |  |

Afgetoseten bewaren op een koele, droge plek. Goed  
afsluiten na gebruik. Een aanvullende mineralvoet  
alleen voor paarden. Geef niet meer dan de  
aanbevolen dosering.

\*Geschikt voor gebruik tijdens wedstrijden volgens  
FEI-richtlijnen.

**DE** Fütterungsanleitung  
Füttern Sie GastriAid täglich um den  
Verdauungsstrakt zu beruhigen und gesund zu halten.

| Pferde                   | g<br>pro Tag | Messlöffel<br>pro Tag |
|--------------------------|--------------|-----------------------|
| Anfangsdosis (3-10 Tage) | 120          | 6                     |
| Erhaltungsdosis          | 60           | 3                     |

| Ponys                    | g<br>pro Tag | Messlöffel<br>pro Tag |
|--------------------------|--------------|-----------------------|
| Anfangsdosis (3-10 Tage) | 80           | 4                     |
| Erhaltungsdosis          | 40           | 2                     |

Währlicher Pferde schrittweise daran gewöhnen.

Die Erhaltungsdosis kann individuell angepasst  
werden und hängt nicht unbedingt vom  
Körpergewicht ab.

Ein abgestrichener 25 ml Messlöffel liefert ca. 20 g  
Bei einer Fütterung von 60 g pro Tag reicht ein 3,6 kg  
Topf für ca. 60 Tage.

#### Inhaltsstoffe

##### Zusammensetzung

Flohsamenschalen (pulverisiert), Natriumbicarbonat,  
Calciumcarbonat, Luzern (hochtemperaturgetrocknet),  
Rapsöl (raffiniert), Bierhefe, Hefeprodukt\*,  
Fructo-Oligosaccharide, Zichorie Inulin (FOS),  
Natriumchlorid, Kalzium Stearat.

\*Hefeprodukte, Quellen für MOS (Mannan-Oligosaccharide)  
und postbiotische Hefemetaboliten.

#### Zusatzstoffe (pro kg)

| Ernährungsphysiologisch |          |
|-------------------------|----------|
| Aminosäuren             |          |
| L-Glutamin (3c451)      | 5.020 mg |

| Technologisch    |            |
|------------------|------------|
| Bindemittel      |            |
| Bentonit (1m558) | 498.000 mg |

| Konservierungsmittel |       |
|----------------------|-------|
| Fumarsäure (1a297)   | 30 mg |

| Zootechnisch                                      |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Verdaulichkeitsförderer                           |                            |
| Saccharomyces cerevisiae<br>(4b1702, CNCM I-4407) | 1,4 x 10 <sup>11</sup> cfu |

| Analytische Bestandteile                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rohprotein 5,8 %, Rohfett 2,7 %, Rohasche 58,7 %, Rohfaser 8,1 %, Natrium 3,4 %, Säurebeständige Asche 34,2 %, Phosphor 0,13 %, Kalzium 3,98 %. |  |

Kühl und trocken lagern. Nach Gebrauch gut  
verschließen. Ein ergänzendes Mineralfutter nur für  
Pferde. Die empfohlene Fütterung nicht  
überschreiten.

\*Für den Wettbewerb nach FEI-Richtlinien  
geeignet.

**FR** Conseils d'utilisation  
Utiliser GastriAid au quotidien pour apaiser et  
maintenir un système digestif en bonne santé.

| Chevaux                     | par jour | mesures<br>par jour |
|-----------------------------|----------|---------------------|
| Dose de charge (3-10 jours) | 120      | 6                   |
| Maintenance                 | 60       | 3                   |

| Ponys                       | par jour | mesures<br>par jour |
|-----------------------------|----------|---------------------|
| Dose de charge (3-10 jours) | 80       | 4                   |
| Maintenance                 | 40       | 2                   |

Introduire progressivement pour les chevaux à l'appétit  
capricieux. La dose de maintenance doit être ajustée  
en fonction des besoins de chaque cheval ou poney et  
n'est pas strictement liée à la taille de l'animal.

Une mesure rase de 25 ml équivaut  
approximativement à 20 g. 3,6 kg à raison de 60 g par  
jour durera approximativement 60 jours.

#### Ingédients

**Composition**  
Cosses de graines de psyllium (en poudre),  
Bicarbonate de sodium, Carbonate de calcium,  
Luzerne (séchée à haute température), Huile de colza  
(raffinée), Levure de bière, Produit de Levure\*,  
Fructo-oligosaccharides, Chicorie inuline (FOS),  
Chlorure de sodium, Stéarate de calcium.

\*Produits de levure, sources de MOS (Mannan-Oligosaccharides)  
et métabolites postbiotiques de levure.

#### Additifs (par kg)

| Nutritionnel        |          |
|---------------------|----------|
| Acides aminés       |          |
| L-Glutamine (3c451) | 5.020 mg |

| Technologique     |            |
|-------------------|------------|
| Liants            |            |
| Bentonite (1m558) | 498.000 mg |

| Conservateur            |       |
|-------------------------|-------|
| Acide fumarique (1a297) | 30 mg |

| Zootechnique                                      |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Optimisateur de digestibilité                     |                            |
| Saccharomyces cerevisiae<br>(4b1702, CNCM I-4407) | 1,4 x 10 <sup>11</sup> cfu |

| Constituants analytiques                                                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Protéines brutes 5,8 %, Graisses brutes 2,7 %, Cendres brutes 58,7 %, Fibres brutes 8,1 %, Sodium 3,4 %, Cendres insolubles dans l'acide 34,2 %, Phosphore 0,13 %, Calcium 3,98 %. |  |

Conserver dans un endroit frais et sec. Réfermer  
l'emballage après usage. Un aliment minéral  
complémentaire pour usage unique uniquement. Ne pas  
dépasser les doses recommandées.

\*Convient pour l'utilisation en compétition selon les  
normes FEI.

**NAF**  
CLEAN SPORT

NAF GUARANTEE OF QUALITY

Batchnummer en Ten minste houdbaar tot: Zie Pot

Kennnummer der Partie und Mindestens  
haltbar bis: Siehe Gefäß


Numéro de lot et date de péremption: Voir pot



Registered under EC feed  
regulation 1831/2003;  
Reg. No. GB 562/11011



e 3,6kg  
NAF G196.3600.01 V18



For more information about NAF Products or individual advice about your horse's needs please visit [www.naf-equine.eu](http://www.naf-equine.eu)  
or call us on +353 1 485 4539. Nutritional Advanced Formulas (Ireland) Ltd, 13 Classon House, Dundrum Business Park,  
Dundrum, Dublin, D14 X9F9, Ireland. Third Country Representative No: IETCR100103. Manufactured in the UK (GB)

