NAF Liver Support

Support of liver function in the case of chronic liver insufficiency. NAF Liver Support optimises targeted nutrients. Avoid high protein diets. Feed a fibre and forage-based diet.

DE Unterstützung der Leberfunktion bei chronischer Leberinsuffizienz. NAF Liver Support optimiert gezielte Nährstoffe. Eiweißreiche Ernährung vermeiden. Ballaststoff- und faserreiches Futter füttern.

DK Støtte til leverfunktionen i tilfælde af kronisk leverinsufficiens. NAF Liver Support optimerer målrettede næringsstoffer. Undgå diæter med højt proteinindhold. Fodr med en fiber- og grøntfoderbaseret kost.

ES Apoyo a la función hepática en caso de insuficiencia hepática crónica. NAF Liver Support optimiza los nutrientes específicos. Evite dietas con un alto contenido proteínico. La alimentación debe ser a base de forraje y fibra.

FI Maksan toiminnan tukeminen kroonisen maksan vajaatoiminnan yhteydessä. NAF Liver Support optimoi kohdennetut ravintoaineet. Vältä proteiinipitoisia ruokavalioita. Syötä kuitu- ja rehupohjaista ruokavaliota.

SE Stöd för leverfunktionen vid kronisk lever insufficiens. NAF Liver Support optimerar riktade näringsämnen. Undvik dieter med högt proteininnehåll. Ge en fiberrik och grovfoderbaserad foderstat.

FR Soutien de la fonction hépatique en cas d'insuffisance hépatique chronique. NAF Liver Support optimise les nutriments ciblés. Éviter les régimes riches en protéines. Privilégier une alimentation à base de fibres et de fourrage.

IT Supporto della funzionalità epatica in caso di insufficienza epatica cronica. NAF Liver Support ottimizza i nutrienti mirati. Evitare diete ad alto contenuto proteico. Somministrare una dieta a base di fibre e foraggio.

NL Ondersteuning van de leverfunctie bij chronische leverinsufficiëntie. NAF Liver Support optimaliseert gerichte voedingsstoffen. Vermijd eiwitrijke voeding. Zorg voor een vezelrijk dieet op basis van ruwvoer.

HU A májfunkció támogatása krónikus májelégtelenség esetén. A NAF Liver Support optimalizálja a célzott tápanyagokat. Kerülje a magas fehérjetartalmú diétákat. Takarmányozzon rost- és takarmányalapú étrendet.

CZ Podpora funkce jater v případě chronické jaterní nedostatečnosti. NAF Liver Support optimalizuje cílené živiny. Nezavádějte krmivo s vysokým obsahem bílkovin. Používejte krmivo na bázi vlákniny a pícnin.

PT Apoio à função hepática em caso de insuficiência hepática crónica. NAF Liver Support otimiza os nutrientes específicos. Evite dietas ricas em proteínas. Alimente com uma dieta baseada em fibras e forragem.

EE Maksafunktsiooni toetamine kroonilise maksapuudulikkuse korral. NAF Liver Support optimeerib sihtotstarbelisi toitaineid. Vältida kõrge valgusisaldusega dieeti. Sööta kiudaineterikast ja söödapõhist toit.

LV Aknu funkciju atbalsts hroniskas aknu nepietiekamības gadījumā. NAF Liver Support optimizē mērķtiecīgas uzturvielas. Izvairieties no diētām ar augstu olbaltumvielu saturu. Barojiet ar šķiedrvielām un lopbarību saturošu barību.

NO Støtte av leverfunksjonen ved kronisk leverinsuffisiens. NAF Liver Support optimaliserer målrettede næringsstoffer. Unngå proteinrike dietter. Fôr med en diett basert på fiber og grovfôr.

LT Kepenų funkcijos palaikymas esant lėtiniam kepenų nepakankamumui. NAF Liver Support optimizuoja tikslingai parinktas maistines medžiagas. Venkite daug baltymų turinčių dietų. Šerkite ląsteliena ir pašarais pagrįstu maistu.

PL Wspomaganie czynności wątroby w przypadku przewlekłej niewydolności wątroby. NAF Liver Support optymalizuje ukierunkowane składniki odżywcze. Unikać diet wysokobiałkowych. Stosować dietę opartą na błonniku i paszach.

SI Podpora delovanja jeter v primeru kronične jetrne insuficience. NAF Liver Support optimizira ciljno usmerjene hranilne snovi. Izogibajte se visokim proteinskim dietam. Hranite s prehrano, ki temelji na vlakninah in osnovni krmi.

BG Подкрепа на чернодробната функция при хронична чернодробна недостатъчност. NAF Liver Support оптимизира целевите хранителни вещества. Избягвайте диети с високо ниво на протеин. Хранете животното диета от фибри и фураж.

Feeding Instructions

Add to feed daily, split between multiple small meals.

Horses & Ponies	g per day	scoops per day
450 kg +	30	1
<450 kg	15	½

One level 60 ml scoop holds approx. 30 g. Initially feed for up to six months before reassessing. NAF recommend consulting a vet before use or extending use. The simultaneous use of different organic acids or their salts is contraindicated where one or more of them is used at or near the maximum permitted content. NAF Liver Support contains negligible amounts of organic acids, and does not contain choline.

Ingredients

Composition

Milk thistle seed (ground)*^, Brewers' yeast*, Artichoke^ leaves, Maltodextrin#, Beetroot juice, Omicha Berries^, Mushroom^ (dried, edible), Dextrose#, Propylene glycol.

*Protein source. #Digestible carbohydrates, ^Fibre sources

Additives (per kg)

Nutritional	
DL-Methionine (technically pure, 3c301)	183.000 mg
Zinc (Zinc chelate of glycine, hydrate (solid) 3b607)	6.750 mg
Vitamin A (3a672a)	500.000 i.u.
Vitamin D3 (3a671)	113.000 i.u.
Vitamin E (Natural, 3a700ii)	33.500 i.u.
Vitamin K3 (3a711)	219 mg
Sensory	
Mixture of sensory additives (cherry flavour)	30,40 mg
Technological	
Citric Acid (1a330)	500 mg
Zootechnical	
Saccharomyces cerevisiae (4b1702, CNCM I-4407)	2,8 x 10^{11} cfu

Key ingredients per 30 g

Milk thistle	15 g
Natural Vitamin E	1.005 i.u.
Methionine	5.490 mg
Vitamin A	15.000 i.u.
Vitamin D	3.390 i.u.
Vitamin K	6,5 mg
Chelated Zinc	202 mg

Analytical Constituents

Crude Protein	22,7 %
Crude Fat	17,8 %
Crude Ash	7,8 %
Crude Fibre	12,2 %
Sodium	0,06 %

Store in a cool, dry place. Replace lid after use. A complementary dietetic feed for equine use only. Manufactured by GB/562/R1811. UFAS 1033.

ZLAB02395/V1

NAF ★★★★★

CLEAN SPORT

NAF GUARANTEE OF QUALITY

Batch No & Best Before: See pot

NAF A021.0900.M

ISO 9001 Quality Assured Firm · UFAS · BETA · NOPS BETA

GMP+FSA ASSURED

REDUCE REUSE RECYCLE

℮ 900g

5 032410 139235

For more information about NAF Products or individual advice about your horse's needs please visit **www.naf-equine.eu** or call us on **+353 1 224 8758.** Nutritional Advanced Formulas (Ireland) Ltd, 13 Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin, D14 X9F9, Ireland. Third Country Representative No: IETCR100103.

DE KARENZZEIT FEI 0 STUNDEN FN 0 STUNDEN

Fütterungsanleitung: Täglich zum Futter hinzugeben und auf mehrere kleine Mahlzeiten aufteilen.
Pferde & Ponys: 450 kg+ 30 g pro Tag, 450 kg+ Messlöffel 1 pro Tag, <450 kg 15 g pro Tag, <450 kg Messlöffel ½ pro Tag.

Ein abgestrichener 60 ml Messlöffel liefert ca. 30 g. Zunächst bis zu sechs Monate füttern, dann erneut beurteilen lassen. **Inhaltsstoffe: Zusammensetzung:** Mariendistelsamen (Boden)*^, Bierhefe (inaktiviert)*, Artischockenblätter^, Maltodextrin#, Rote-Bete-Saft, Schisandrabeeren^, Pilz^ (getrocknet, essbar), Dextrose#, Propylenglykol. *Proteinquelle. #Verdauliche Kohlenhydrate, ^Ballaststoffquellen. **Zusatzstoffe (pro kg): Ernährungsphysiologisch:** DL-Methionin (teknisk ren, 3c301) 183.000 mg, Zink (Zinkchelat af glycinhydrat, fast form, 3b607) 6.750 mg, Vitamin A (3a672a) 500.000 i.e., Vitamin D3 (3a671) 113.000 i.e., E-vitamin (Naturlig, 3a700ii) 33.500 i.e., Vitamin K3 (3a711) 219 mg. **Sensorisch:** Gemisch von sensorisch Aromastoffen (Kirschgeschmack) 30,40 mg. **Technologisch:** Zitronensäure (1a330) 500 mg. **Zootechnisch:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 2,8x10^{11} cfu. **Wichtige Inhaltsstoffe pro 30 g:** Mariendistel 15 g, Natürliches Vitamin E 1.005 i.e., Methionin 5.490 mg, Vitamin A 15.000 i.e., Vitamin D 3.390 i.e., Vitamin K 6,5 mg, Chelatiertes Zink 202 mg. **Analytische Bestandteile:** Rohprotein 22,7 %, Rohfett 17,8 %, Rohasche 7,8 %, Rohfaser 12,2 %, Natrium 0,06 %. Kühl und trocken lagern. Nach Gebrauch gut verschließen. Ein ergänzendes, diätetisches nur zur Verwendung bei Pferden. NAF empfiehlt, vor der Anwendung einen Tierarzt zu konsultieren. Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn eines oder mehrere von diesen in oder beinahe in ihrem Höchstgehalt angewendet werden. NAF Liver Support enthält vernachlässigbare Mengen organischer Säuren, und enthält kein Cholin.

DK KONKURRENCE KARENSTID FEI 0 TIMER

Fodringsvejledning: Tilsæt til foderet dagligt, fordelt på flere små måltider.
Heste & Ponyer: 450 kg+ 30 g/dag, 450 kg+ 1 skefulde/dag, <450 kg 15 g/dag, <450 kg ½ skefulde/dag.

Én skefuld på 60 ml svarer til ca. 30 g. Fodr i første omgang i op til seks måneder, før du revurderer. **Ingredienser: Sammensætning:** Marietidsel-frø (Jord)*^, Bryggergær (inaktiveret)*, Artiskok blade^, Maltodekstrin#, Rødbedejuice, Omicha bær^, Champignon^ (tørrede, spiselig), Dekstrose#, Propylen Glycol. *Proteinkilde. #Fordøjelige kulhydrater, ^Fiberkilder. **Tilsætningsstoffer (per kg):** Ernæringsmæssige: DL-Methionin (teknisk ren, 3c301) 183.000 mg, Zink (Zinkchelat af glycinhydrat, fast form, 3b607) 6.750 mg, Vitamin A (3a672a) 500.000 i.e., Vitamin D3 (3a671) 113.000 i.e., E-vitamin (Naturlig, 3a700ii) 33.500 i.e., Vitamin K3 (3a711) 219 mg. **Sensorisk:** Mix af sensorisk smagskomponenter (Kirsebærmag) 30,40 mg. **Teknologiske:** Citronsyre (1a330) 500 mg. **Zootekniske:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 2,8x10^{11} cfu. **Hovedingredienser pr. 30 g:** Marietidsel 15 g, Naturlig E-vitamin 1.005 i.e., Methionin 5.490 mg, Vitamin A 15.000 i.e., Vitamin D 3.390 i.e., Vitamin K 6,5 mg, Zink i chelatform 202 mg. **Analytiske Bestanddele:** Råprotein 22,7 %, Råfedt 17,8 %, Råaske 7,8 %, Råfibre 12,2 %, Natrium 0,06 %. Opbevares køligt og tørt. Sæt låget på efter brug. Et tilskudsfoder diætetisk foder udelukkende til brug for heste. NAF anbefaler at konsultere en dyrlæge før brug eller forlængelse af brugen. Samtidig anvendelse af forskellige organiske syrer eller salte deraf er kontraindiceret, hvor en eller flere af dem benyttes ved eller nær det maksimalt tilladte indhold. NAF Liver Support indeholder minimale mængder af organiske syrer, og indeholder ikke cholin.

ES PLAZO DE RETIRADA FEI 0 HORAS

Modo de empleo: Añada el producto al forraje a diario, repartiéndolo entre varias comidas pequeñas.
Caballos & Ponis: 450 kg+ 30 gr./día, 450 kg+ 1 medidas/día, <450 kg 15 gr./día, <450 kg ½ medidas/día.

Una cuchara de 60 ml proporciona aprox. 30 g. Comience por administrar el producto durante seis meses para, seguidamente, reevaluar. **Ingredientes: Composición:** Semillas de Silybum marianum (Suelo)*^, Levadura de cerveza (inactivada)*, Hojas de alcachofa^, Maltodextrina#, Jugo de remolacha, Bayas de Omicha^, Hongos^ (secos, comestibles), Dextrosa#, Glicol de propileno. *Fuente de proteínas. #Carbohidratos digestibles, ^Fuentes de fibra. **Aditivos (por kg): Nutricional:** DL-Methionina (técnicamente puro, 3c301) 183.000 mg, Zinc (Zinc quelado de Glicina, hidrato sólido, 3b607) 6.750 mg, Vitamina A (3a672a) 500.000 u.i., Vitamina D3 (3a671) 113.000 u.i., Vitamina E (Natural, 3a700ii) 33.500 u.i., Vitamina K3 (3a711) 219 mg. **Sensoriales:** Mezcla de sensoriales componentes aromatizantes (con sabor a cereza) 30,40 mg. **Tecnológico:** Ácido cítrico (1a330) 500 mg. **Zootécnico:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 2,8x10^{11} cfu. **Ingredientes principales por 30 g:** Silybum marianum 15 g, Vitamina E natural 1.005 u.i., Metionina 5.490 mg, Vitamina A 15.000 u.i., Vitamina D 3.390 u.i., Vitamina K 6,5 mg, Zinc quelado 202 mg. **Análisis:** Proteína bruta 22,7 %, Grasa bruta 17,8 %, Cenizas brutas 7,8 %, Fibra bruta 12,2 %, Sodio 0,06 %. Conservar en un lugar fresco y seco. Cerrar la tapa después de cada uso. Un pienso dietético complementario de uso exclusivo para equinos. NAF recomienda consultar a un veterinario antes de usar o de prolongar el uso. El uso simultáneo de diferentes ácidos orgánicos o de sus sales está contraindicado cuando uno o más de ellos se utilizan con un contenido igual o próximo al máximo permitido. NAF Liver Support contiene cantidades insignificantes de ácidos orgánicos, y no contiene colina.

FI FEI KARENSSIAIKA 0 TUNTIA HIPPOS 0 TUNTIA

Ruokintaohjeet: Lisää rehuun päivittäin, jaa useisiin pieniin aterioihin.
Hevoset ja ponit: 450 kg+ 30 g päivässä, 450 kg+ 1 mitta päivässä, <450 kg 15 g päivässä, <450 kg ½ mitta päivässä.

Yksi 60 ml:n lusikallinen painaa noin 30 g. Syötä aluksi enintään kuuden kuukauden ajan ennen uudelleenarviointia. **Raaka-aineet: Koostumus:** Maarianohdake siemenet (maa)*^, Panimohiiva (inaktivoitu)*, Artisokan lehdet^, Maltodekstriini#, Punajuurimehu, Omicha marjat^, Sienet^ (kuivattu, syötävä), Dekstroosi#, Propylene glycol. *Proteiinin lähde. #Sulavat hiilihydraatit, ^Kuidun lähteet. **Lisäaineet (kohti kg): Ravitsemuksellisia:** DL-metioniini (teknisesti puhdas, 3c301) 183.000 mg, Sinkki (Glysiinin sinkkikelaattihydraatti, kiinteä, 3b607) 6.750 mg, A-vitamiini (3a672a) 500.000 i.u., D3-vitamiini (3a671) 113.000 i.u., E-vitamiini (Luonnon, 3a700ii) 33.500 i.u., K3-vitamiini (3a711) 219 mg. **Sensoriset:** Yhdiste eri sensoriset lisäaineet (kirsikkainmakuinen) 30,40 mg. **Teknologinen:** Sitruunahappo (1a330) 500 mg. **Eläintekninen:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 2,8x10^{11} cfu. **Ainesosat 30 g:aa kohti:** Maarianohdake 15 g, Luonnon E-vitamiini 1.005 i.u., Metioniini 5.490 mg, A-vitamiini 15.000 i.u., D-vitamiini 3.390 i.u., K-vitamiini 6,5 mg, Sinkkikelaatti 202 mg. **Ravintoaineet:** Raakaproteiini 22,7 %, Raakarasva 17,8 %, Raakatuhka 7,8 %, Raakakuitu 12,2 %, Natrium 0,06 %. Säilytä tuotetta viileässä ja kuivassa paikassa. Aseta kansi takaisin paikalleen käytön jälkeen. Täydentävä erityisruokavalio rehu vain hevosille. NAF suosittelee eläinlääkärin konsultointia ennen käyttöä tai käytön jatkamista. Eri orgaanisten happojen tai niiden suolojen samanaikainen käyttö on vasta-aiheista, jos yhtä tai useampaa niistä käytetään suurimmalla sallitulla pitoisuudella tai lähellä sitä. NAF Liver Support sisältää vähäisiä määriä orgaanisia happoja, eikä sisällä koliinia.

SE STC/SvRF 0 TIMMAR TÄVLINGSKARENS FEI 0

Utfodringsanvisning: Tillsätt till fodret dagligen, fördelat över flera små måltider.
Hästar & Ponnyer: 450 kg+ 30 g/dag, 450 kg+ 1 mått/dag, <450 kg 15 g/dag, <450 kg ½ mått/dag.

En skopa innehåller 60 ml som motsvarar ca 30 g. Ge initialt foder i upp till sex månader innan du utvärderar det igen. **Ingredienser: Sammansättning:** Frön från Mariatistel (mark)*^, Bryggerijäst (inaktiverad)*, Blad från jordärtskocka^, Maltodextrin#, Rödbetssaft, Omija-bär^, Svamp^ (torkad, ätbar), Dextros#, Propylenglykol. *Proteinkälla. #Smältbara kolhydrater, ^Fiberkällor. **Tillsatser (per kg): Näringstillsatser:** DL-Metionin (tekniskt ren, 3c301) 183.000 mg, Zink (Zinkkelat av glycin, hydrat (fast), 3b607) 6.750 mg, Vitamin A (3a672a) 500.000 i.e., Vitamin D3 (3a671) 113.000 i.e., Vitamin E (Naturligt, 3a700ii) 33.500 i.e., Vitamin K3 (3a711) 219 mg. **Sensoriska:** Blandning av sensoriska tillsatser (körsbärsmak) 30,40 mg. **Tekniska:** Citronsyra (1a330) 500 mg. **Zootekniska:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 2,8x10^{11} cfu. **Nyckelingredienser per 30 g:** Mariatistel 15 g, Naturligt vitamin E 1.005 i.e., Metionin 5.490 mg, Vitamin A 15.000 i.e., Vitamin D 3.390 i.e., Vitamin K 6,5 mg, Kelaterat zink 202 mg. **Analytiska Beståndsdelar:** Råprotein 22,7 %, Råfetter 17,8 %, Råaska 7,8 %, Råfiber 12,2 %, Natrium 0,6 %. Förvaras torrt och svalt. Återförslut lock efter användning. Ett kompletterande dietiskt endast för häst. NAF rekommenderar att du rådgör med en eller veterinär före användning eller vid förlängd användning. Olika organiska syror eller salter bör inte användas samtidigt om en eller flera av dem används vid eller nära högsta tillåtna mängd. NAF Liver Support innehåller en obetydlig mängd organiska syror, och innehåller inte kolin.

FR DÉLAI D'ARRÊT D'UTILISATION AVANT COMPETITION FEI 0 HEURE

Conseils d'utilisation: Ajouter quotidiennement à la ration, répartie en plusieurs petits repas.
Chevaux & Poneys: 450 kg+ 30 g par jour, 450 kg+ 1 mesures par jour, <450 kg 15 g par jour, <450 kg ½ mesures par jour.

Une mesure rase de 60 ml équivaut approximativement à 30 g. Administrer initialement jusqu'à six mois, avant de réévaluer. **Ingrédients: Composition:** Graines de Chardon Marie (sol)*^, Levure de bière (inactivée)*, Feuilles d'artichaut^, Maltodextrine#, Jus de betterave, Baies d'Omicha^, Champignon^ (séché, comestible), Dextrose#, Propylène glycol. *Source de protéines. #Glucides digestibles, ^Sources de fibres. **Additifs (par kg): Nutritionnel:** DL-Méthionine (techniquement pure, 3c301) 183.000 mg, Zinc (Chélate de zinc de glycine, solide hydraté, 3b607) 6.750 mg, Vitamine A (3a672a) 500.000 u.i., Vitamine D3 (3a671) 113.000 u.i., Vitamine E (Naturelle, 3a700ii) 33.500 u.i., Vitamine K3 (3a711) 219 mg. **Sensoriel:** Mélange de sensoriel composés aromatisants (goût cerise) 30,40 mg. **Technologique:** Acide citrique (1a330) 500 mg. **Zootechnique:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 2,8x10^{11} cfu. **Ingrédients clés pour 30 g:** Chardon Marie 15 g, Vitamine E naturelle 1.005 u.i., Méthionine 5.490 mg, Vitamine A 15.000 u.i., Vitamine D 3.390 u.i., Vitamine K 6,5 mg, Zinc chélaté 202 mg. **Constituants Analytiques:** Protéines brutes 22,7 %, Graisses brutes 17,8 %, Cendres brutes 7,8 %, Fibres brutes 12,2 %, Sodium 0,06 %. Conserver dans un endroit frais et sec. Refermer l'emballage après usage. Aliment complémentaire diététique pour usage équin uniquement. NAF recommande de consulter un vétérinaire avant utilisation ou prolongation de l'utilisation. L'utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu'un ou plusieurs d'entre eux sont utilisés à une concentration égale ou proche de la concentration maximale autorisée. NAF Liver Support contient des quantités négligeables d'acides organiques, et ne contient pas de choline.

IT PERIODO DI SOSPENSIONE FEI 0 ORE

Istruzioni di somministrazione: Aggiungere al mangime ogni giorno, dividendolo in vari piccoli pasti.
Cavalli e pony: 450 kg+ 30 g al giorno, 450 kg+ 1 misurini al giorno, <450 kg 15 g al giorno, <450 kg ½ misurini al giorno.

Un misurino raso da 60 ml fornisce circa 30 g. Inizialmente somministrare per un massimo di sei mesi prima di una rivalutazione. **Ingredienti: Composizione:** Semi di cardo mariano (macinati)*^, Lievito di birra (inattivato)*, Foglie di carciofo^, Maltodestrina#, Succo di barbabietola rossa, Bacche di schisandra^, Funghi^ (essiccati, commestibili), Destrosio#, Glicole propilenico. *Fonte proteica. #Carboidrati digeribili, ^Fonti di fibre. **Additivi (per kg): Nutrizionali:** DL-Metionina (tecnicamente puro, 3c301) 183.000 mg, Zinco (Kelatoitu sinkki di idrato di glicina, solido, 3b607) 6.750 mg, Vitamina A (3a672a) 500.000 u.i., Vitamina D3 (3a671) 113.000 u.i., Vitamina E (Naturale, 3a700ii) 33.500 u.i., Vitamina K3 (3a711) 219 mg. **Organolettici:** Miscela di sostanze aromatizzanti (aroma di ciliegia) 30,40 mg. **Tecnologici:** Acido citrico (1a330) 500 mg. **Zootecnico:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 2,8x10^{11} cfu. **Ingredienti principali per 30 g:** Cardo mariano 15 g, Vitamina E naturale 1.005 u.i., Metionina 5.490 mg, Vitamina A 15.000 u.i., Vitamina D 3.390 u.i., Vitamina K 6,5 mg, Zinco chelato 202 mg. **Costituenti Analitici:** Proteine grezze 22,7 %, Grassi grezzi 17,8 %, Ceneri grezze 7,8 %, Fibre grezze 12,2 %, Sodio 0,06 %. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Riporre in posizione corretta e con il coperchio dopo l'uso. Mangime dietetico complementare per uso solamente equino. NAF raccomanda di consultare un veterinario prima dell'uso o di prolungarne l'uso. L'uso simultaneo di diversi acidi organici o dei loro sali è controindicato quando uno o più di essi viene utilizzato al contenuto massimo consentito o vicino ad esso. NAF Liver Support contiene quantità trascurabili di acidi organici, e non contiene colina.

NL WACHTTIJD VOLGENS FEI 0 UREN

Gebruik: Voeg aan dagelijkse voeding toe, verdeeld over meerdere kleine maaltijden.
Paarden & Pony's: 450 kg+ 30 g per dag, 450 kg+ 1 schepjes per dag, <450 kg 15 g per dag, <450 kg ½ schepjes per dag.

Een afgestreken maatschepje van 60 ml bevat ongeveer 30 g. Dien de voeding aanvankelijk maximaal zes maanden toe voordat u dit opnieuw beoordeelt. **Ingrediënten: Samenstelling:** Zaden van mariadistel (Grond)*^, Biergist (geïnactiveerd)*, Artisjok bladeren^, Maltodextrin#, Rode bieten sap, Omicha bessen^, Paddestoel^ (gedroogd, eetbaar), Dextrose#, Propyleenglycol. *Eiwitbron. #Verteerbare koolhydraten, ^Vezels. **Toevoegingen (per kg): Nutritioneel:** DL-Methionine (technisch zuiver, 3c301) 183.000 mg, Zink (Zinkchelaat van glycinehydraat (vast), 3b607) 6.750 mg, Vitamine A (3a672a) 500.000 i.e., Vitamine D3 (3a671) 113.000 i.e., Vitamine E (Natuurlijke, 3a700ii) 33.500 i.e., Vitamine K3 (3a711) 219 mg. **Sensoriële:** Mengsel van sensoriële smaakstoffen (kersen smaak) 30,40 mg. **Technologisch:** Citroenzuur (1a330) 500 mg. **Zoötechnisch:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 2,8x10^{11} cfu. **Hoofdingrediënten per 30 g:** Mariadistel 15 g, Natuurlijke vitamine E 1.005 i.e., Methionine 5.490 mg, Vitamine A 15.000 i.e., Vitamine D 3.390 i.e., Vitamine K 6,5 mg, Zinkchelaat 202 mg. **Analytische Bestanddelen:** Ruw eiwit 22,7 %, Ruw vet 17,8 %, Ruwe as 7,8 %, Ruwe vezels 12,2 %, Natrium 0,06 %. Afgesloten bewaren op een koele, droge plek. Goed afsluiten na gebruik. Aanvullend dieetvoeder, uitsluitend voor paarden. NAF raadt u aan contact op te nemen met een dierenarts vóór gebruik, of bij verlengd gebruik. Gelijktijdig gebruik met andere organische zuren of zouten daarvan is gecontra-indiceerd als een of meer van die zuren of zouten om en nabij het maximaal toelaatbare gehalte worden gebruikt. NAF Liver Support bevat verwaarloze hoeveelheden aan organische zuren, en bevat geen choline.

HU ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ FEI 0 ÓRA

Etetési útmutató: Adja a takarmányhoz naponta, több kis étkezés között elosztva.
Lovak & Pónik: 450 kg+ 30 g naponta, 450 kg+ 1 mérőkanál naponta, <450 kg 15 g naponta, <450 kg ½ mérőkanál naponta.

A lapos 60 ml-es mérőkanál körülbelül 30 grammnak felel meg. Kezdetben legfeljebb hat hónapig etessük, mielőtt újraértékeljük. **Tartalmaz: Összetevők:** Máriatövis (föld)*^, Sörélesztő (inaktivált)*, Articsóka levél^, Maltodextrin#, Cékla lé, Omicha bogyó^, Gomba^ (szárított, ehető), Dextróz#, Propilén-glikol. *Fehérjeforrás. #Emészthető szénhidrátok, ^Rostforrások. **Adalékanyagok (kg-onként): Táplálkozási:** DL-Methionin (technikailag tiszta, 3c301) 183.000 mg, Cink (Glicin cinkkelátja, hidrát szilárd állapotban, 3b607) 6.750 mg, A Vitamin (3a672a) 500.000 n.e., D3 Vitamin (3a671) 113.000 n.e., E-vitamin (Természetes, 3a700ii) 33.500 n.e., K3 Vitamin (3a711) 219 mg. **Érzékszervi:** Ízesítő keverék (cseresznye ízesítés) 30,40 mg. **Technológiai:** Citromsav (1a330) 500 mg. **Zootechnikai:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 2,8x10^{11} cfu. **Főbb összetevők 30 g-enként:** Máriatövis 15 g, Természetes E-vitamin 1.005 n.e., Methionin 5.490 mg, A Vitamin 15.000 n.e., D Vitamin 3.390 n.e., K Vitamin 6,5 mg, Cink-kelát 202 mg. **Analitikai Alkotóelemek:** Nyersfehérje 22,7 %, Nyerszsír 17,8 %, Nyershamu 7,8 %, Nyersrost 12,2 %, Nátrium 0,06 %. Hűvös, száraz helyen tartandó. Használat után visszazárandó. Kiegészítő diétás anyag takarmány kizárólag lovak részére. NAF javasolja, hogy a használat vagy a használat meghosszabbítása előtt konzultáljon állatorvossal. Különböző szerves savak vagy sóik egyidejű használata ellenjavallt, ha egy vagy több közülük a megengedett maximális mennyiségnél vagy annak közelében van. NAF Liver Support elhanyagolható mennyiségű szerves savakat tartalmaz, és nem tartalmaz kolint.

CZ OCHRANNÁ LHŮTA FEI 0 HODINY

Krmný návod: Přidávejte do krmiva každý den, rozdělte mezi více malých sazba.
Koně & Poníci: 450 kg+ 30 g/den, 450 kg+ 1 odměrky/den, <450 kg 15 g/den, <450 kg ½ odměrky/den.

Jedna zarovnaná 60 ml odměrka obsahuje přibližně 30 g. Zpočátku podávejte po dobu až šesti měsíců a poté proveďte nové posouzení. **Složení:** Ostropestřec mariánský semena (mleté)*^, Pivovarské kvasnice (inaktivované)*, Artyčok listy^, Maltodextrin#, Šťáva z červené řepy, Klanopraška čínská^, Houby^ (sušené, jedlé), Dextróza#, Propylenglykol. *Zdroj bílkovin. #Stravitelné sacharidy, ^Zdroje vlákniny. **Doplňkové látky (na kg): Nutriční:** DL-methionin (technicky čisté, 3c301) 183.000 mg, Zinek (Zinkový chelát glycinu, pevný hydrát, 3b607) 6.750 mg, Vitamín A (3a672a) 500.000 m.j., Vitamín D3 (3a671) 113.000 m.j., Vitamín E (Přírodní, 3a700ii) 33.500 m.j., Vitamín K3 (3a711) 219 mg. **Senzorické:** Směs aromatických látek (Třešeňnová příchut) 30,40 mg. **Technologické:** Kyselina citronová (1a330) 500 mg. **Zootechnické:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 2,8x10^{11} cfu. **Hlavní složky na 30 g:** Ostropestřec mariánský 15 g, Přírodní vitamín E 1.005 m.j., Methionin 5.490 mg, Vitamín A 15.000 m.j., Vitamín D 3.390 m.j., Vitamín K 6,5 mg, Chelátový zinek 202 mg. **Analytické Složky:** Hrubý protein 22,7 %, Hrubý tuk 17,8 %, Hrubý popel 7,8 %, Hrubá vláknina 12,2 %, Sodík 0,06 %. Skladujte v suchu a chladu. Po použití pevně uzavřete. Doplňkové dietetické krmivo pouze pro koně. NAF doporučuje poradit se před užíváním nebo prodloužením užívání s veterinářem. Současné použití různých organických kyselin nebo jejich solí je kontraindikováno, pokud je jedna nebo více z nich používáno v maximálním povoleném obsahu nebo blízko něj. NAF Liver Support obsahuje zanedbatelné množství organických kyselin, a neobsahuje cholin.

PT INTERVALO DE SEGURANÇA FEI 0 HORAS

Recomendações de administração: Adicione à ração diariamente, dividido por várias refeições pequenas.
Cavalos e Póneis: 450 kg+ 30 (g) quantidade diária, 450 kg+ 1 medida/dia, <450 kg 15 (g) quantidade diária, <450 kg ½ medida/dia.

Uma medida pelo nível de 60 ml fornece aproximadamente 30 gr. Inicialmente alimente até seis meses antes de reavaliar. **Ingredientes: Composição:** Sementes de cardo mariano (chão)*^, Levedura de cerveja (inactivada)*, Folhas de Alcachofra^, Maltodextrina#, Sumo de Beterraba, Bagas Schisandra Chinensis^, Cogumelo^ (desidratado, comestível), Dextrose#, Propilenoglicol. *Fonte de proteína. #Carboidratos digestíveis, ^Fontes de fibras. **Aditivos (por kg): Nutricional:** DL-Metionina (tecnicamente pura, 3c301) 183.000 mg, Zinco (Zinco quelato de glicina, hidrato sólido, 3b607) 6.750 mg, Vitamina A (3a672a) 500.000 i.u., Vitamina D3 (3a671) 113.000 i.u., Vitamina E (Natural, 3a700ii) 33.500 i.u., Vitamina K3 (3a711) 219 mg. **Organolépticos:** Mistura de compostos aromatizantes (sabor a cereja) 30,40 mg. **Aditivos tecnológicos:** Ácido cítrico (1a330) 500 mg. **Zootécnico:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 2,8x10^{11} cfu. **Ingredientes principais por 30 g:** Cardo de Leite 15 g, Vitamina E natural 1.005 i.u., Metionina 5.490 mg, Vitamina A 15.000 i.u., Vitamina D 3.390 i.u., Vitamina K 6,5 mg, Zinco Quelatado 202 mg. **Constituintes Analíticos:** Proteína bruta 22,7 %, Gordura bruta 17,8 %, Cinzas totais 7,8 %, Fibra bruta 12,2 %, Sódio 0,06 %. Manter num local fresco e seco. Fechar bem depois de usar. Complemento dietético apenas para uso em equinos. NAF recomenda consultar um médico veterinário antes de utilizar ou prolongar a utilização. A utilização simultânea de diferentes ácidos orgânicos ou dos seus sais é contra-indicada quando um ou mais deles são utilizados no teor máximo permitido ou próximo deste. NAF Liver Support contém quantidades insignificantes de ácidos orgânicos, e não contém colina.

EE KEELUAEG FEI 0 TUNDI

Söötmisjuhis: Lisada söödale iga päev, jaotatuna mitme väikese söögikorra vahel.
Hobused & Ponid: 450 kg+ 30 g päevas, 450 kg+ 1 kühvlitäit päevas, <450 kg 15 g päevas, <450 kg ½ kühvlitäit päevas.

Üks lame 60 ml kühvel mahutab umbes 30 g. Esialgu toita kuni kuus kuud enne ümberhindamist. **Koostisosad: Koostis:** Piimaohaka seemned (Maa)*^, Õllepärm (inaktiveeritud)*, Artišoki lehed^, Maltodekstriin#, Peedimahl, Omicha marjad^, Seened^ (kuivatatud, söödavad), Dekstroos#, Propüleenglükool. *Valgu allikas, #Seedetavad süsivesikud, ^Kiudainete allikad. **Lisandid (kg kohta): Toitainelised:** DL-metioniin (tehniliselt puhas, 3c301) 183.000 mg, Tsink (Glütsiini tsinkkelaat, tahke hüdraat, 3b607) 6.750 mg, A-vitamiin (3a672a) 500.000 i.u., D3 vitamiin (3a671) 113.000 i.u., E-vitamiin (Looduslik, 3a700ii) 33.500 i.u., K3 vitamiin (3a711) 219 mg. **Sensoorsed:** Sensoorsed maitseühendite segu (kirss maitseaine) 30,40 mg. **Tehnoloogiline:** Sidrunhape (1a330) 500 mg. **Zootehniline:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 2,8x10^{11} cfu. **Peamised koostisosad 30 g kohta:** Piimaohakas 15 g, Looduslik E-vitamiin 1.005 i.u., Metioniin 5.490 mg, A-vitamiin 15.000 i.u., D-vitamiin 3.390 i.u., K-vitamiin 6,5 mg, Kelaaditud tsink 202 mg. **Analüütilised Koostisosad:** Toorvalk 22,7 %, Toorrasv 17,8 %, Toortuhk 7,8 %, Toorkiud 12,2 %, Naatrium 0,06 %. Hoida jahedas ja kuivas. Pärast kasutamist asetage kaas tagasi. Täiendav dieetsööt ainult hobustele. NAF soovitab enne kasutamist või kasutamise pikendamist konsulteerida loomaarstiga. Erinevate orgaaniliste hapete või nende soolade samaaegne kasutamine on vastunäidustatud, kui ühte või mitut neist kasutatakse maksimaalse lubatud sisalduse juures või selle lähedal. NAF Liver Support sisaldab vähesel määral orgaanilisi happeid, ja ei sisalda koliini.

LV IZDALĪŠANĀS PERIODS FEI 0 STUNDAS

Lietošana: Pievienojiet barībai katru dienu, sadalot porcijās vairākās nelielās ēdienreizēs.
Zirgi un poniji: 450 kg+ 30 g dienā, 450 kg+ 1 kausiņi dienā, <450 kg 15 g dienā, <450 kg ½ kausiņi dienā.

Viens 60 ml kausiņš bez kaudzes satur aptuveni 30 g. Sākotnēji barot līdz sešiem mēnešiem, pirms atkārtotas novērtēšanas. **Sastāvdaļas: Sastāvs:** Piena dadžu sēklas (Zeme)*^, Alus raugs (Inaktivēts)*, Artišoku lapas^, Maltodekstrīns#, Biešu sula, Omicha ogas^, Sēnes (kaltētas, ēdamas)^, Dekstroze#, Propilēnglikols. *Olbaltumvielu avots. #Viegli uzsūcamie ogļhidrāti, ^Šķiedru avoti. **Piedevas (uz kg): Uzturam:** DL-metionīns (tehniski tīrs, 3c301) 183.000 mg, Cinks (Glicīna cinka helāts, ciets hidrāts, 3b607) 6.750 mg, A vitamīns (3a672a) 500.000 S.V., D3 vitamīns (3a671) 113.000 S.V., E vitamīns (Dabīgais, 3a700ii) 33.500 S.V., K3 vitamīns (3a711) 219 mg. **Organoleptiskās:** Smaržas un garšas pastiprinātāju savienojumu maisījums (ķiršu aromāts) 30,40 mg. **Tehnoloģiskās:** Citronskābe (1a330) 500 mg. **Zootehnisks:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 2,8x10^{11} cfu. **Galvenās sastāvdaļas uz 30 g:** Piena dadzis 15 g, Dabīgais E vitamīns 1.005 s.v., Metionīns 5.490 mg, A vitamīns 15.000 s.v., D vitamīns 3.390 s.v., K vitamīns 6,5 mg, Helatēts cinks 202 mg. **Analītiskie Komponenti:** Kopproteīns 22,7 %, Koptauki 17,8 %, Koppelni 7,8 %, Kopšķiedra 12,2 %, Nātrijs 0,06 %. Uzglabāt sausā, vēsā vietā. Pēc lietošanas aizvērt. Diētiskā kas paredzēta tikai zirgiem. Pirms lietošanas vai pagarinātas lietošanas NAF iesaka konsultēties ar veterinārārstu. Dažādu organisko skābju vai to sāļu vienlaicīga lietošana ir kontrindicēta, ja viena vai vairākas no tām tiek lietotas maksimāli pieļaujamā daudzumā vai tuvu tam. NAF Liver Support satur nenozīmīgu organisko skābju daudzumu, un nesatur holīnu.

NO DNT/NRYF 0 TIMER MED KONKURRANSE FEI 0

Fôringsinstruksjoner: Tilsett i fôret daglig, fordelt på flere små måltider.
Hester og ponnier: 450 kg+ 30 g/dag, 450 kg+ 1 måleskjeer per dag, <450 kg 15 g/dag, <450 kg ½ måleskjeer per dag.

Én nivå 60 ml måleskje gir ca. 30 g. Gis innledningsvis i seks måneder før en ny vurdering. **Ingredienser: Sammensetning:** Melketistelfrø (Bakken)*^, Bryggergjær (inaktivert)*, Artisjokkblader^, Maltodekstrin#, Rødbetsaft, Omija-bær^, Sopp^ (tørket, spiselig), Dekstrose#, Propylenglykol. *Proteinkilde. #Fordøyelige karbohydrater, ^Fiberkilder. **Tilsetningsstoffer (per kg): Næringsrikt:** DL-metionin (teknisk rent, 3c301) 183.000 mg, Sink (Sinkkelat av glycin, hydrat fast, 3b607) 6.750 mg, Vitamin A (3a672a) 500.000 i.e., Vitamin D3 (3a671) 113.000 i.e., Vitamin E (Naturlig, 3a700ii) 33.500 i.e., Vitamin K3 (3a711) 219 mg. **Sensorisk:** Blanding av sensorisk smakstilsetninger (kirsebærsmak) 30,40 mg. **Teknologisk:** Sitronsyre (1a330) 500 mg. **Zooteknisk:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 2,8x10^{11} cfu. **Nøkkelingredienser per 30 g:** Melketistel 15 g, Naturlig vitamin E 1.005 i.e., Metionin 5.490 mg, Vitamin A 15.000 i.e., Vitamin D 3.390 i.e., Vitamin K 6,5 mg, Chelatert sink 202 mg. **Analytiske Bestanddeler:** Råprotein 22,7 %, Råfett 17,8 %, Råaske 7,8 %, Råfiber 12,2 %, Natrium 0,06 %. Oppbevar på et kjølig og tørt sted. Bytt lokket etter bruk. Et utfyllende diettfôr kun for hester. NAF anbefaler å konsultere veterinær før bruk eller forlengelse av bruken. Samtidig bruk av forskjellige organiske syrer eller deres salter er kontraindisert når en eller flere av dem brukes ved eller nær det maksimalt tillatte innholdet. NAF Liver Support inneholder ubetydelige mengder organiske syrer, og inneholder ikke kolin.

LT NUTRAUKIMO LAIKOTARPIS FEI 0 VALANDOS

Šėrimo instrukcijos: Dėkite į kasdienį pašarą, padalykite į kelis nedidelius patiekalus.
Žirgai ir poniai: 450 kg+ 30 g per dieną, 450 kg+ 1 kaušeliai (-ių) per dieną, <450 kg 15 g per dieną, <450 kg ½ kaušeliai (-ių) per dieną.

Viename nubrauktame 60 ml talpos šaukštelyje telpa maždaug 30 g. Iš pradžių šerkite iki šešių mėnesių, o po to iš naujo įvertinkite. **Ingredientai: Sudėtis:** Pieno raktažolių sėklos (Žemė)*^, Alaus mielės (inaktyvuotos)*, Artišoko lapai^, Maltodekstrinas#, Burokėlių sultys, Kininio citrinvyčio uogos^, Grybai^ (džiovinti, valgomieji), Dekstrozė#, Propilenglikolis. *Baltyminis šaltinis. #Virškinami angliavandeniai, ^Ląstelienos šaltiniai. **Priedai (vienam kg): Mitybinė informacija:** DL-metioninas (techniškai grynas, 3c301) 183.000 mg, Cinkas (Glicino cinko chelatas, kietasis hidratas, 3b607) 6.750 mg, Vitaminas A (3a672a) 500.000 t.v., Vitaminas D3 (3a671) 113.000 t.v., Vitaminas E (Natūralus, 3a700ii) 33.500 t.v., Vitaminas K3 (3a711) 219 mg. **Sensorinis:** Sudėtinis sensorinis kvapiųjų medžiagų mišinys (vyšnia skonio) 30,40 mg. **Technologinis:** Citrinos rūgštis (1a330) 500 mg. **Zootechninis:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 2,8x10^{11} cfu. **Pagrindiniai ingredientai 30 g:** Pieno raktažolių 15 g, Natūralus vitaminas E 1.005 t.v., Metioninas 5.490 mg, Vitaminas A 15.000 t.v., Vitaminas D 3.390 t.v., Vitaminas K 6,5 mg, Chelatinis cinkas 202 mg. **Analitinės Sudedamosios Dalys:** Neapdirbti baltymai 22,7 %, Neapdorotas riebalai 17,8 %, Neapdirbti pelenai 7,8 %, Žalia ląsteliena 12,2 %, Natris 0,06 %. Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje. Po naudojimo uždėkite dangtelį. Papildomas dietinis pašaras, skirtas tik arkliams. NAF rekomenduoja prieš naudojant arba pratęsiant naudojimą pasikonsultuoti su veterinarijos gydytoju. Vienu metu naudoti skirtingas organines rūgštis ar jų druskas draudžiama, jei vienos ar kelių iš jų kiekis yra toks arba artimas didžiausiam leistinam kiekiui. NAF Liver Support yra nedidelis kiekis organinių rūgščių, ir jo sudėtyje nėra cholino.

PL OKRES KARENCJI FEI 0 GODZINY

Instrukcja karmienia: Dodawać do karmy codziennie, rozdzielając na kilka małych posiłków.
Konie i kucyki: 450 kg+ 30 g dziennie, 450 kg+ 1 miarek dziennie, <450 kg 15 g dziennie, <450 kg ½ miarek dziennie.

Jedna poziomowa miarka 60 ml zawiera około 30 g. Na początku podawać przez okres do sześciu miesięcy, a następnie poddać ponownej ocenie. **Składniki: Skład:** Nasiona ostropestu plamistego (mielone)*^, Drożdże piwne (inaktywowane)*, Liście karczocha^, Maltodekstryna#, Sok z buraków, Cytryniec chiński^, Grzyb^ (suszony, jadalny), Dekstroza#, Glikol propylenowy. *Źródło białka. #Węglowodany strawne, ^Źródła błonnika. **Dodatki (na kg): Składniki odżywcze:** DL-metionina (technicznie czysta, 3c301) 183.000 mg, Cynk (Chelatowany glicynian cynku, hydrat w postaci stałej, 3b607) 6.750 mg, Witamina A (3a672a) 500.000 i.u., Witamina D3 (3a671) 113.000 i.u., Witamina E (Naturalna, 3a700ii) 33.500 i.u., Witamina K3 (3a711) 219 mg. **Sensoryczne:** Mieszanka substancji sensoryczne aromatyzujących (smak wiśnia) 30,40 mg. **Technologiczne:** Kwas cytrynowy (1a330) 500 mg. **Zootechniczne:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 2,8x10^{11} cfu. **Kluczowe składniki na 30 g:** Ostropest plamisty 15 g, Naturalna witamina E 1.005 i.u., Metionina 5.490 mg, Witamina A 15.000 i.u., Witamina D 3.390 i.u., Witamina K 6,5 mg, Cynk chelatowany 202 mg. **Składniki Analityczne:** Białko surowe 22,7 %, Tłuszcze surowe 17,8 %, Popiół surowy 7,8 %, Włókno surowe 12,2 %, Sód 0,06 %. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Po użyciu założyć pokrywę. Uzupełniająca pasza dietetyczna przeznaczona wyłącznie dla koni. NAF zaleca skonsultowanie się z weterynarzem przed użyciem lub dłuższym stosowaniem. Jednoczesne stosowanie różnych kwasów organicznych lub ich soli jest przeciwwskazane, gdy jeden lub więcej z nich jest stosowany w maksymalnym stężeniu lub zbliżonym do maksymalnego. NAF Liver Support zawiera znikome ilości kwasów organicznych, i nie zawiera choliny.

SI OBDOBJE ODVAJANJA FEI 0 URE

Navodila za krmljenje: Dodajajte k hrani vsak dan, razdelite na več manjših obrokov.
Konji in poniji: 450 kg+ 30 g na dan, 450 kg+ 1 merice na dan, <450 kg 15 g na dan, <450 kg ½ merice na dan.

Ena poravnana merica s prostornino 60 ml vsebuje približno 30 g. Sprva hranite do šest mesecev, preden ponovno ocenite stanje. **Sestavine: Sestava:** Seme mlečnega osata (mleto)*^, Pivski kvas (inaktiviran)*, Listi artičoke^, Maltodekstrin#, Sok rdeče pese, Omicha jagode^, Gobe^ (posušene, užitne), Dekstroza#, Propilen glikol. *Vir beljakovin. #Prebavljivi ogljikovi hidrati, ^Viri vlaknin. **Aditivi (na kg): Prehranski:** DL-metionin (tehnično čista, 3c301) 183.000 mg, Cink (Cinkov kelat glicina, trdni hidrat, 3b607) 6.750 mg, Vitamin A (3a672a) 500.000 i.e., Vitamin D3 (3a671) 113.000 i.e., Vitamin E (Naravni, 3a700ii) 33.500 i.e., Vitamin K3 (3a711) 219 mg. **Čutila:** Mešanica aromatičnih snovi (okus češnja) 30,40 mg. **Tehnološko:** Citronska kislina (1a330) 500 mg. **Zootehniški:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 2,8x10^{11} cfu. **Ključne sestavine na 30 g:** Mlečnega osata 15 g, Naravni vitamin E 1.005 i.e., Metionin 5.490 mg, Vitamin A 15.000 i.e., Vitamin D 3.390 i.e., Vitamin K 6,5 mg, Kelatni cink 202 mg. **Analitske Sestavine:** Surove beljakovine 22,7 %, Surova maščobe 17,8 %, Surovi pepel 7,8 %, Surova vlakna 12,2 %, Natrij 0,06 %. Hranite na hladnem, suhem mestu. Po uporabi zamenjajte pokrov. Dopolnilna dietetična krma samo za konje. NAF priporoča se pred uporabo ali nadaljnjo uporabo posvetujete z veterinarjem. Sočasna uporaba različnih organskih kislin ali njihovih soli je kontraindicirana, če se ena ali več organskih kislin uporablja pri najvišji dovoljeni vsebnosti ali blizu nje. NAF Liver Support vsebuje zanemarljive količine organskih kislin, in ne vsebuje holina.

BG СРОК ЗА ОТТЕГЛЯНЕ FEI 0 ЧАСА

Инструкции за хранене: Добавяйте към храната ежедневно, като разделяте на няколко малки порции.
Коне и понита: 450 kg+ 30 g на ден, 450 kg+ 1 лъжици на ден, <450 kg 15 g на ден, <450 kg ½ лъжици на ден.

Една равна лъжица от 60 ml съдържа приблизително 30 g. Като начало го давайте на животното за шест месеца преди да направите нова преценка. **Съставки: Състав:** Семена от бял трън (Земя)*^, Бирена мая (инактивирани)*, Листа от артишок^, Малтодекстрин#, Сок свеклы, Плодове от шизандра^, Гъби^ (сушени, ядливи), Декстроза#, Пропиленгликоль. *Източник на протеини. #Смилаеми въглехидрати, ^Източници на фибри. **Добавки (на кг): Хранителна:** DL-метионин (технически чист, 3c301) 183.000 mg, Цинк (Цинков хелат на глицинов хидрат (твърд), 3b607) 6.750 mg, Витамин А (3a672a) 500.000 i.u., Витамин D3 (3a671) 113.000 i.u., Витамин Е (Естествен, 3a700ii) 33.500 i.u., Витамин К3 (3a711) 219 mg. **Сензорни:** Смес от сензорни добавки (Череша аромат) 30,40 mg. **Технологический:** Лимонена киселина (1a330) 500 mg. **Зоотехнически:** Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 (4b1702) 2,8x10^{11} cfu. **Основни съставки за 30 g:** Бял трън 15 g, Естествен витамин Е 1.005 i.u., Метионин 5.490 mg, Витамин А 15.000 i.u., Витамин D 3.390 i.u., Витамин К 6,5 mg, Хелатиран цинк 202 mg. **Аналитични съставки:** Суров протеин 22,7 %, Сурови мазнини 17,8 %, Сурова пепел 7,8 %, Сурови фибри 12,2 %, Натрий 0,06 %. Съхранявайте на хладно и сухо място. Сменете капака след употреба. Допълнителен диетичен фураж само за еднокопитни животни. NAF препоръчва да се консултирате с ветеринарен лекар преди употреба или продължителна употреба. Едновременната употреба на различни органични киселини или техните соли е противопоказана, когато една или повече от тях се използват при максималното допустимо съдържание или близо до него. NAF Liver Support съдържа незначителни количества органични киселини, и не съдържа холин.

BLEED

CUT LINE

SAFE AREA

HINGE